

FILAL WG

FUNGICIDA

Grânulos dispersíveis em água com 80% (p/p) de fosetil - Al

Fungicida sistémico para o combate aos fungos do género Phytophthora em laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e limoeiro, macieira e pereira.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Autorização de venda Nº 1518, concedida pela DGAV

Capacidade da embalagem: 1 Kg e 5kg

Um produto:

INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Ca. Ciudad de Sevilla Nº 53
46988 Paterna (Valência) Espanha
Tel. (34) 961321700
Fax (34) 961321716
E.mail: afrasa@afrasa.es

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.
R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49
Zona Industrial de Santarém
2005-002 Várzea Santarém
Tel. 253 217 304
iqvportugal@iqvagro.pt

Fungicida sistémico com mobilidade ascendente e descendente, com atividade essencialmente preventiva atuando através do estímulo das defesas fisiológicas das plantas e com ligeira ação curativa direta sobre o patógeno.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Cultura	Problema	Concentração / Dose	Época de aplicação	I.S.
Laranjeira Tangerineira (inclui clementina e híbridos) Limoeiro	Gomose (<i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasítica</i>)	250 g/hl	Realizar as aplicações no período de crescimento ativo da árvore, logo que surjam os primeiros sintomas de gomose. Aplicar a 3 meses de intervalo reduzidos para 2 meses em casos graves.	15 dias
	Mildio ou aguado (<i>Phytophthora cithrophthora</i> , <i>P. Hibernalis</i> , <i>P. Citricola</i> , <i>P. Syringae</i> e <i>P. Nicotianae</i> var. <i>parasítica</i>)	250 g/hl	Aplicar de novembro até fevereiro, desde que o tempo decorra frio e chuvoso. Caso necessário repetir a aplicação com intervalos de 1 mês.	15 dias
Macieira e Pereira	<i>Podridão do colo e das raízes</i> (<i>Phytophthora cactorum</i>)	250 g/hl	Efetuar pulverizações mensais, desde que a folhagem seja abundante para absorção do produto.	15 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Não utilizar o produto em fruta destinada a transformação industrial.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequada para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO:

Calibrar correctamente o equipamento assegurando a uniformidade da distribuição da calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Em aplicação em laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e limoeiro, macieira e pereira com um volume de calda de 1000l/ha.

INCOMPATIBILIDADES:

O FILAL WG é incompatível com produtos à base de óleos minerais, cobre e adubos foliares.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal: ATENÇÃO

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado

P501a Eliminar Conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas

SpePT1 Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície

SPOPT2 Na entrada do trabalhadores nas áreas tratadas durante 24 horas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,
Telef: 800 250 250**



SPTT3 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado.

Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.