

LAINCOIL

INSETICIDA

Concentrado para emulsão (EC) contendo 790 g/L ou 94,05% (p/p) de óleo parafínico

LAINCOIL é um acaricida e inseticida para utilização em laranjeira, limoeiro, tangerineira (incluindo mandarinas), lima, toranjeira, ameixeira, cerejeira, pessegueiro (incluindo nectarinas), damasqueiro, macieira, pereira, pera nashi e marmeleiro no combate a ácaros e cochonilhas

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Autorização de Venda Nº 0928, concedida pela DGAV

Capacidade da embalagem: 1L, 5L e 20L

Um produto:

LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8-12 - 08191 Rubí (Barcelona) -
Espanha

Distribuído por:

IQV Agro Portugal S.A.
R. Dr. Hilário Barreiro Nunes, Lt 49
Zona Industrial de Santarém
2005-002 Várzea Santarém
Tel. 253 217 304
iqvportugal@iqvagro.pt

LAINCOIL é um acaricida e inseticida com base em óleo parafínico, não sistémico, de amplo espectro de ação, pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos alcanos. Atua principalmente por asfixia, cobrindo o corpo dos insetos com uma fina camada oleosa impermeável que bloqueia os canais traqueais, impedindo a respiração e provocando a sua morte.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

| Cultura | Problema | Concentração/ Dose | Aplicações |
|--|---|-------------------------------|---|
| Laranjeira, Limoeiro, Tangerineira (incluindo Mandarinas), Lima e Toranjeira | Aranhão-vermelho-dos-citrosos (Panonychus citri), ácaro-do-texas (Eutetranychus banksi), aranhão-amarelo (Tetranychus urticae), cochonilha-pinta-vermelha (Aonidiella aurantii), cochonilha-branca (Aspidiotus nerii), cochonilha-vírgula (Lepidosaphes beckii) e parlatoria (Parlatoria pergandii) | 1 a 1,5 L/hl | Aplicar antes da mudança de cor dos frutos, em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento por inimigo. Volume de calda de 1000-2000 L/ha. |
| Ameixeira, Cerejeira, Pessegueiro (incluindo Nectarinas) e Damasqueiro | Cochonilha-de-São-José (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,75 a 1 L/hl | Aplicar antes do abrolhamento dos gomos florais, em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento. Volume de calda de 500-1500 L/ha. |
| Macieira, Pereira, Pêra Nashi e Marmeleiro | Cochonilha de São José (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,75 a 1 L/hl | Aplicar antes do início da floração, em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento. Volume de calda de 500-1500 L/ha. |

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS:

Não aplicar antes de perfazer 40 dias após a realização de tratamentos com enxofre, captana e folpete.

Ter especial cuidado em garantir a adequada cobertura da vegetação pelo produto, evitando excesso de calda.

Não aplicar em dias quentes e secos e quando exista previsão de geadas.

LAINCOIL é também eficaz no combate a fumagina, limpando a vegetação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA:

Agitar a embalagem antes de usar. No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre. Manter a agitação em funcionamento durante toda a aplicação.

Preparar apenas a quantidade de calda de que irá necessitar.

Não deixar a calda no tanque do pulverizador durante muito tempo.

Para realização de misturas de LAINCOIL com outros produtos, por favor, consultar o Departamento Técnico da Lainco, S.A. ou o seu distribuidor.

MODO DE APLICAÇÃO:

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS:

Rotulagem conforme o regulamento (CE) No. 1272/2008 [CRE/GHS]:

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal: PERIGO

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P331: NÃO provocar o vômito

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPe3: Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em citrinos e 10 metros em pomóideas e prunóideas, em relação às águas de superfície.

SPe3: Para proteção de artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti Venenos,
Telef: 800 250 250**



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retroma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Armazenamento: Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado e seco.

Nota: As recomendações e informações facultadas são o resultado de estudos e ensaios, amplos e rigorosos. Contudo, numerosos fatores fora do nosso controlo podem intervir durante o seu uso (preparação de misturas, aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição, formulação e teor. O utilizador será responsável por estragos (falta de eficácia, toxicidade em geral, resíduos, etc.) causados pela não observância total ou parcial das instruções contidas no rótulo.